



Smoking's Impact in Multi-Unit Housing

Multi-unit housing refers to housing units under one or multiple buildings. Smoking in multi-unit housing exposes tenants to the harmful effects of chemicals from secondhand smoke (SHS) and third-hand smoke (THS).

THE NEGATIVE IMPACT CAUSED BY SMOKING IN MULTI-UNIT HOUSING

2 in 5
Children are exposed to secondhand smoke.

Nicotine sticks to surfaces like clothing, floors, toys, and walls, which is known as thirdhand smoke.

Smoking in multi-unit housing is the leading cause of residential fires, causing 14% of deaths.

THE NEGATIVE IMPACT ON HISPANIC/LATINOS

29.9%
of Mexican American children 3 to 11 years have been exposed to SHS

6.2 MILLION
of Mexican American nonsmokers are exposed to SHS

43,000+
Hispanics are diagnosed with tobacco-related cancer every year

65%
of Hispanics reported SHS was an issue in their residence

56%
of U.S. tenants would support a smoke-free policy

35%
of Hispanics would take action against SHS

Sources: American Lung Association, 2017; American Nonsmokers' Rights Foundation, 2014 & 2018; Baezconde-Garbanati et al. 2011; CDPH CTCP, 2017; Campaign for Tobacco Free Kids, 2018



UnidosPorSalud



California Health Collaborative

For more information contact Unidos Por Salud at
(559)408-4365 or unidospor salud@healthcollaborative.org
For help quitting, call the California Smokers' Helpline
1-800-NO BUTTS

Unidos Por Salud is funded by the California Department of Public Health, California Tobacco Control Program Contract No. 17-10969.



Impacto de Fumar en Viviendas Multifamiliares

Viviendas multifamiliares se refiere a habitaciones bajo uno o múltiple edificios, como apartamentos. Fumando en estas viviendas expone a inquilinos a los efectos dañinos del humo de segunda y tercera mano.

EL IMPACTO NEGATIVO CAUSADO POR FUMAR EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

2 de cada 5
niños son expuestos al humo de segunda mano

Nicotina se pega a superficies como ropa, el piso, juguetes, y paredes; conocido como humo de tercera mano.

Fumar en viviendas multifamiliares es la causa principal de incendios residenciales causando 14% de muertes.

EL IMPACTO NEGATIVO EN LOS HISPANO/LATINOS

29.9%

de

niños mexicoamericanos de 3 a 11 años fueron expuestos al humo de segunda mano

6.2 MILLIONES

de

mexicoamericanos que no fuman son expuestos al humo de segunda mano

43,000+

hispanos son diagnosticados con cáncer relacionado al tabaco cada año

65%

de

hispanos reportaron que el humo de segunda mano era un problema en su hogar

56%

de

inquilinos en los Estados Unidos apoyarían una póliza libre de humo

35%

de

hispanos tomarían acción contra el humo de segunda mano

Fuentes: American Lung Association, 2017; American Nonsmokers' Rights Foundation, 2014 & 2018; Baezconde-Garbanati et al. 2011; CDPH CTCP, 2017; Campaign for Tobacco Free Kids, 2018



UnidosporSalud



California
Health Collaborative

Para más información puede contactar a Unidos Por Salud al
(559)408-4365 o unidospor salud@healthcollaborative.org

Para ayuda para dejar de fumar, llame a la Línea de
Ayuda Para Fumadores de California

1-800-45-NO-FUME